



ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата
Бронхипрет®

наименование лекарственного препарата

сироп

лекарственная форма, дозировка

Бионорика СЕ, Германия

наименование производителя, страна

Изменение № 2 **230125**

Дата внесения Изменения «___» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Противопоказания</p> <p>Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата, к другим растениям семейства аралиевые и/или яснотковые, а также к березе, полыни, сельдерее; недостаточность сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; беременность, период грудного вскармливания; детский возраст (до 1 года). Вследствие наличия этанола, не рекомендуется назначать препарат при алкоголизме, эпилепсии, заболеваниях печени, заболеваниях головного мозга, черепно-мозговой травме.</p>	<p>Противопоказания</p> <p>Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата, к другим растениям семейства аралиевые и/или яснотковые, а также к березе, полыни, сельдерее; недостаточность сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; беременность, период грудного вскармливания. Препарат Бронхипрет® сироп противопоказан детям от 0 до 2 лет (из-за риска ухудшения респираторных симптомов заболевания вследствие приема препарата, обладающего секретолитическим действием). Вследствие наличия</p>

	этанолом, не рекомендуется назначать препарат при алкоголизме, эпилепсии, заболеваниях печени, заболеваниях головного мозга, черепно-мозговой травме.																											
<p>Способ применения и дозы</p> <p>Препарат назначается внутрь, после еды, 3 раза в день (утром, днем и вечером).</p> <table border="1" data-bbox="263 824 853 1400"> <thead> <tr> <th>Возраст</th> <th>Разовая доза</th> <th>Суточная доза</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Дети в возрасте от 1 года до 2 лет</td> <td>2,2 мл</td> <td>6,6 мл</td> </tr> <tr> <td>Дети в возрасте от 2 до 6 лет</td> <td>3,2 мл</td> <td>9,6 мл</td> </tr> <tr> <td>Дети в возрасте от 6 до 12 лет</td> <td>4,3 мл</td> <td>12,9 мл</td> </tr> <tr> <td>Дети в возрасте от 12 лет и взрослые</td> <td>5,4 мл</td> <td>16,2 мл</td> </tr> </tbody> </table> <p>Неразведенный препарат Бронхипрет® сироп рекомендуется запить водой.</p> <p>Дозирование препарата осуществляется с использованием прилагаемого мерного стаканчика.</p> <p>Курс лечения – 10-14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.</p> <p>Если в период лечения улучшения</p>	Возраст	Разовая доза	Суточная доза	Дети в возрасте от 1 года до 2 лет	2,2 мл	6,6 мл	Дети в возрасте от 2 до 6 лет	3,2 мл	9,6 мл	Дети в возрасте от 6 до 12 лет	4,3 мл	12,9 мл	Дети в возрасте от 12 лет и взрослые	5,4 мл	16,2 мл	<p>Способ применения и дозы</p> <p>Препарат назначается внутрь, после еды, 3 раза в день (утром, днем и вечером).</p> <table border="1" data-bbox="893 824 1484 1258"> <thead> <tr> <th>Возраст</th> <th>Разовая доза</th> <th>Суточная доза</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Дети в возрасте от 2 до 6 лет</td> <td>3,2 мл</td> <td>9,6 мл</td> </tr> <tr> <td>Дети в возрасте от 6 до 12 лет</td> <td>4,3 мл</td> <td>12,9 мл</td> </tr> <tr> <td>Дети в возрасте от 12 лет и взрослые</td> <td>5,4 мл</td> <td>16,2 мл</td> </tr> </tbody> </table> <p>Неразведенный препарат Бронхипрет® сироп рекомендуется запить водой.</p> <p>Дозирование препарата осуществляется с использованием прилагаемого мерного стаканчика.</p> <p>Курс лечения – 10-14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.</p> <p>Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы</p>	Возраст	Разовая доза	Суточная доза	Дети в возрасте от 2 до 6 лет	3,2 мл	9,6 мл	Дети в возрасте от 6 до 12 лет	4,3 мл	12,9 мл	Дети в возрасте от 12 лет и взрослые	5,4 мл	16,2 мл
Возраст	Разовая доза	Суточная доза																										
Дети в возрасте от 1 года до 2 лет	2,2 мл	6,6 мл																										
Дети в возрасте от 2 до 6 лет	3,2 мл	9,6 мл																										
Дети в возрасте от 6 до 12 лет	4,3 мл	12,9 мл																										
Дети в возрасте от 12 лет и взрослые	5,4 мл	16,2 мл																										
Возраст	Разовая доза	Суточная доза																										
Дети в возрасте от 2 до 6 лет	3,2 мл	9,6 мл																										
Дети в возрасте от 6 до 12 лет	4,3 мл	12,9 мл																										
Дети в возрасте от 12 лет и взрослые	5,4 мл	16,2 мл																										

<p>не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.</p>	<p>усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.</p>
<p>Организация, принимающая претензии потребителей ООО «Бионорика» 119619, г. Москва, 6-я ул. Новые сады, д. 2, корп. 1. тел./факс +7 (495) 502-90-19, адрес электронной почты: info@bionorica.ru</p>	<p>Организация, принимающая претензии потребителей ООО «Бионорика» 115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 4 Тел./факс: +7 495 502 90 19 Адрес электронной почты: info@bionorica.ru</p>

Представитель ООО «Бионорика»

Чупринова Я.А.



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
Менеджер отдела по
регуляторным и редакционным
вопросам
Чуринова Я.А.
« 11 »

